

ブリヌスプリ錠 25mg

【この薬は？】

販売名	ブリヌスプリ錠 25mg Brinsupri Tablets
一般名	ブレンソカチブ水和物 Brensocatib Hydrate
含有量 (1錠中)	ブレンソカチブ水和物 26.07mg (ブレンソカチブとして 25mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・ この薬は、ジペプチジルペプチターゼ 1 (DPP1) 阻害薬と呼ばれる薬です。
- ・ この薬は、DPP1 を阻害することにより好中球セリンプロテアーゼの活性を低下さ

せ気管支拡張症の慢性的な炎症を抑制します。

- ・ 次の病気の人に処方されます。

非嚢胞性線維症性気管支拡張症

- ・ この薬は、過去の呼吸器疾患の増悪歴、緑膿菌等の定着状況、喀痰等の呼吸器症状等を勘案し、抗菌薬投与を必要とする呼吸器疾患の増悪を繰り返すリスクのある人に対して使用されます。
- ・ この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・ 過去にブリススプリ錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・ 妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・ 授乳中の人

【この薬の使い方は？】

- ・ 通常、成人および12歳以上の小児の飲む量および回数は、次のとおりです。

●使用量および回数

1回量	1錠
飲む回数	1日1回

●どのように使用するか？

- ・ コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●使用し忘れた場合の対応

- ・ 飲み忘れた場合は、飲み忘れた分は服用せず、翌日の通常の服用時間に1回分を服用してください。
- ・ 飲み忘れた分を補うために、2回分を一度に服用しないでください。

●多く使用した時（過量投与時）の対応

- ・ 異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ 歯ぐきの腫れ、赤み、歯みがき時の出血、歯ぐきや歯の痛み・違和感、口臭が気になるなどの歯肉障害や歯周病があらわれることがあります。この薬を使用している間はブラッシングなどで口腔内を清潔に保つようにしてください。これらの症状があらわれた場合には、歯科を受診してください。
- ・ この薬を使用している間は生ワクチン〔麻疹（はしか）、風疹（ふうしん）、おたふく風邪、水痘（みずぼうそう）、BCG など〕の接種はできません。接種の必要がある場合は主治医に相談してください。
- ・ 妊婦または妊娠の可能性のある人は医師に相談してください。
- ・ 授乳している人は医師に相談してください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

【この薬の形は？】

販売名	ブリヌスプリ錠 25mg		
色・性状	灰色のフィルムコーティング錠		
形状	表面	裏面	側面
			
直径	9.0mm		
厚さ	4.2mm		
重さ	310mg		
識別コード	BRE/25		

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ブレンソカチブ水和物
添加剤	結晶セルロース、リン酸水素カルシウム水和物、デンプングリコール酸ナトリウム、含水二酸化ケイ素、グリセリン脂肪酸エステル、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、酸化チタン、マクロゴール 4000、タルク、黒酸化鉄

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・ 直射日光と湿気を避けて室温（１～３０℃）で保管してください。
- ・ 子どもの手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：インスメッド合同会社 (<https://insmed.jp/>)

メディカルインフォメーションセンター

電話番号 ０１２０－１１８８０８

受付時間 ９：００～１７：３０

（土、日、祝日および当社休業日を除く）